

PÁPULA EN MUCOSA LABIAL INFERIOR: HIPERPLASIA FIBROSA

PAPULE IN LOWER LABIAL MUCOSA: FIBROUS HYPERPLASIA

Jafet A. Jáuregui L.¹, Rosa B. Figueroa P.¹, Ana E. Sánchez B.¹
aelizabethsanchezb.ucg@gmail.com

Palabras clave. Hiperplasia, reactiva, trauma.

Introducción. La hiperplasia fibrosa también llamada fibroma traumático o irritativo, es una lesión reactiva resultado de un proceso de reparación crónico, que se manifiesta como un aumento de volumen fibroso en la submucosa. Pueden ser causadas por traumatismos repetitivos en el mismo sitio como mordedura crónica [1,2], por lo que su principal localización es lengua y mucosa bucal. Son lesiones del mismo color de la mucosa, de pocos milímetros, con crecimiento lento y que varían de consistencia suave a firme. Las recurrencias son raras y no tiene riesgo de malignidad [2-4].

Reporte de caso. Paciente femenino de 68 años de edad, acude a la clínica por el motivo de realizarse una limpieza dental. A la exploración intrabucal se observaba una pápula de superficie lisa y del mismo color de la mucosa adyacente, que midió aproximadamente 6 mm de diámetro, localizada en la mucosa labial inferior de lado derecho cerca del plano de oclusión y a la palpación era de consistencia suave (figura 1). Al interrogatorio la paciente refirió varios meses de evolución asintomática y antecedente de trauma (mordedura accidental), durante ese tiempo ha notado periodos de disminución del tamaño de la lesión. Se solicitan estudios prequirúrgicos y se programa para biopsia excisional, con el diagnóstico presuntivo de hiperplasia fibrosa versus mucocele. El estudio histopatológico reportó hiperplasia fibrosa.

Discusión. En la literatura se discute el verdadero origen de este tipo de lesiones, algunos autores la definen erróneamente como una neoplasia, aunque se trata de una lesión reactiva a trauma local [1-3].

Conclusiones. El tratamiento de este tipo de lesiones es quirúrgico [3] y se debe realizar el estudio histopatológico, el cual confirma de que tejido provienen, ya que existe una variedad de lesiones que tienen características clínicas similares como el mucocele o algunas de tejido nervioso [3,5].

Referencias.

1. Bhandarkar G., Shetty K. (2017). Differential diagnoses of elevated lesions of the upper lip: an overview. *J. Cancer Res. Ther.* **13**(2): 170-174.
2. Phore S., Panchal R. (2018). Traumatic oral lesions: pictorial essay. *Med J DY Patil Vidyapeeth.* **11**: 94-98.
3. Singh N., Bilichodmath S., Sambhashivaiah S. (2016). Traumatic fibroma: a case series. *J. Health Sci. Res.* **7**(1): 28-31.
4. Jain D., Mohan R., Sinha S., Singh V., Singh A. (2016). Irritational fibroma of lower labial mucosa: a case report. *Int. J. Dent. Med. Spec.* **3**(1): 16-19.
5. Gudi S., Sikkerimath B., Puranik R., Kasbe S. (2013). Swelling on lower lip... not always a mucocele!!!. *Ann. Maxillofac. Surg.* **3**(1): 98-99.



Figura 1. Hiperplasia fibrosa en mucosa labial inferior, secundaria a mordedura crónica.